



TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CONTRA EL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1) **ESTRATEGIA DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS, CURATIVOS Y DE MANTENIMIENTO**, en palmeras sanas de forma preventiva, o en las afectadas que se han recuperado.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5 Tratamientos al año					++		oo		++	oo		++
Productos y dosis	++ Clorpirifos 40% EC: 20cc cada 10 l de agua oo Imidacloprid 20% SL: 7,5cc cada 10 l de agua											

2) **ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO DE CHOQUE, en palmeras afectadas.**

(En caso de una detección precoz y una vez hecho un saneamiento a la palmera)

TRATAMIENTOS (momentos de hacerlos)	PRODUCTOS Y DOSIS
1º Tratamiento (inmediatamente después de la detección)	Clorpirifos 48% EC (20 cc cada 10 litros de agua)
2º Tratamiento (a los 15 días)	
A partir del segundo tratamiento, aplicar la estrategia de tratamientos preventivos, curativos y mantenimiento	

3) **¿COMO APLICAR EL TRATAMIENTO?**

- Se tiene que mojar bien la base de las hojas, haciendo que el caldo se deposite en las axilas de éstas
- Mojar bien todas las formas afectadas de la balona de la palmera.
- La forma que da mejores resultados es disponiendo una alcachofa de ducha al final de la manga de tratamientos
- El gasto del caldo por palmera y tratamiento tiene que ser de 15-20 litros o más.

A las palmeras que no han estado nunca afectadas, si se quieren tener garantías de que no se afecten, también hay que hacer tratamientos preventivos periódicos.

La vigilancia con mucho cuidado de las palmeras sensibles, es una herramienta muy importante en la lucha contra el picudo. Es fundamental la detección de ataques incipientes con la máxima precocidad. La eficacia de los tratamientos es mayor cuando menor es la gravedad del ataque.

Telefono de contacto 971.35.63.17 Departamento de Economía, Medio Ambiente y Caza. Área de Sanidad Vegetal

La ejecución de los tratamientos deben ser realizados por personal cualificado y deben de seguir las instrucciones de normativa de seguridad y salud correspondientes y las pautas que establece el Real Decreto de Productos fitosanitarios para realizar un uso sostenible de los productos.

Sintomatología de Picudo Rojo en *Phoenix Canariensis*

Se sabe que el picudo rojo tiene preferencia por la palmera canaria, preferentemente de género masculino, y en ejemplares altos y con mantenimiento nulo o escaso.

El picudo ataca a nivel de balona y hojas y los síntomas son los siguientes:

- Perforaciones y mordidas de las hojas, preferentemente jóvenes. Palmas en forma de punta de flecha.
- El ojo de la palmera se muestra desplazado o no hay.
- Acortamiento de las hojas.
- Caída de hojas en estado avanzado.
- Restos de pupas o capullos entre las palmas.
- Restos de palmas, fibras y capullos en tierra.
- Presencia de orificios al realizar cortes en las vainas de las hojas.

Medidas culturales con carácter general para la prevención del Picudo Rojo

1. Inspección exhaustiva de las palmeras por **personal formado** en el diagnóstico en fase de detección precoz.
2. Tratamientos siguiendo las directrices indicadas.
3. PODAS:
 - Las podas en palmeras únicamente se pueden realizar en los meses de **diciembre, enero y febrero**. No podar hojas verdes.
 - Pintado inmediato de las hojas cortadas tras poda con pintura en spray, para romper la atracción por poda.
 - Inspección exhaustiva por personal formado en el diagnóstico en fase de detección precoz tras la poda.
 - Tratamiento fitosanitario con las materias autorizadas inmediatamente después de la poda. (max.24h).
4. Se deberá eliminar todos los brotes o hijuelos de palmeras datileras.
5. No se recomienda la reposición de palmeras.